

**Investigación Exploratoria
Sobre SSyR y Prevalencia de
Violencia familiar y de pareja en la
adolescencia**

SAGIJ 2010

EQUIPO DE TRABAJO

- **Dra. Miriam Elena Salvo** Coordinadora
- **Dra. Dora Daldevich**
- **Dra. Sandra Vázquez**
- **Sr. Jorge Paccetti**
- **Lic. Obst. Silvana Varela**
- **Delegaciones**

Objetivos Primarios:

- 1-Obtener información sobre indicadores de salud sexual y reproductiva (uso/no, de métodos anticonceptivos y embarazos) en la población femenina de 10 a 19 años inclusive, que haya iniciado relaciones sexuales.
- 2- Investigar la prevalencia de violencia familiar y de pareja en la población encuestada.

Objetivos secundarios:

1. Describir las características socio-demográficas de la población encuestada
2. Investigar edad de la menarca y caracterizar la forma de inicio de relaciones sexuales
3. Establecer si determinadas prácticas sexuales (sexo anal u oral) se adoptan como forma para evitar un embarazo.
4. Describir el número de adolescentes con embarazos que tienen antecedente de violencia familiar y/o de pareja
5. Evaluar conocimiento a cerca de ITS, e investigar percepción de riesgo de las mismas
6. Evaluar consumo de sustancias adictivas.

Material y Métodos

■ 1- Población a estudiar:

Mujeres de 10 a 19 años con IRS
(consentimiento informado)

■ 2- Diseño del estudio:

observacional descriptivo transversal,
mediante la utilización de una encuesta

■ 3- Tamaño de la muestra

Material y Métodos

■ 4- Análisis estadístico de los resultados

- Los datos recolectados fueron analizados mediante la utilización del software Stata 9.0, para variables cuantitativas se utilizaron medidas de tendencia central con sus respectivas dispersiones según correspondieran, para variables cualitativas se utilizaron frecuencias (porcentajes). Para la comparación de variables cuantitativas, se utilizó el Test de Student o Man Whitney según la distribución de la muestra.
- Para variables cualitativas, se utilizó chi cuadrado o Fisher exact test según la distribución de la frecuencia en las tablas de doble entrada. Se consideraron diferencias estadísticamente significativas con un p valor menor a 0.05

RESULTADOS

- Se tomaron 1441 encuestas de las cuales se descartaron 109 por no reunir los criterios de inclusión correspondientes al universo seleccionado. Por lo tanto para el análisis se tomaron en cuenta 1332 encuestas.

- **Procedencia de las encuestas:**

Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Salta, Corrientes, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Bahía Blanca, Santa Fe: Rosario, Santa Fe: Paraná, Entre Ríos, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba

- **Instituciones donde se tomó la encuesta:**

Sector Público: 65.5%

Obras Sociales: 28.1 %

Privados: 6.5%

UBICACIÓN	RECIBIDAS	DESCARTADAS	PROCESADO
BS AS ZONA NORTE	26		26
BS AS ZONA OESTE	74	2	72
BS AS ZONA SUR	139	16	123
LA PLATA	43		43
BAHIA BLANCA	38		38
SALTA	47		47
JUJUY	46	8	38
TUCUMAN	93	1	92
CORDOBA	222	41	181
MENDOZA	115	23	92
SAN LUIS	41		41
PATAGONIA ANDINA			0
ROSARIO	46		46
CORRIENTES	49		49
SAN JUAN			0
LA RIOJA			0
MISIONES	37		37
SANTIAGO DEL ESTERO	105	13	92

RESULTADOS

■ **EDAD PROMEDIO:** 17.3 DS 1.54

■ **LUGAR DE RESIDENCIA:** residentes de zonas urbanas

CABA 4.1%

Conurbano Bonaerense: 24.7%

Interior del país : 71.2%

■ **ESCOLARIDAD:**

Sin estudios: 0.4

Primaria incompleta: 5.7%

Primaria completa: 7.3%

Primaria en curso: 1.7%

Secundario incompleto: 23.7

Secundario completo: 8.2%

Secundaria en curso: 34%

Terciario/universitario en curso: 19%

Entre 17 y 19 años: sólo 27.2% tienen secundario completo y terciario en curso

RESULTADOS

■ TRABAJO:

Trabajan 24% de las encuestadas

■ GRUPO CONVIVIENTE

Con su familia de origen (padres) 43.6%

Sola con la pareja: 6.5%

Con otros familiares: 25.7%

Situación de calle: 0.2%

Sola: 2%

Con la familia de la pareja y la pareja 22%

RESULTADOS

■ EDAD DE LA MENARCA.

Promedio: 12.2 años DS 1.27

■ EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES

Promedio: 15 años DS 1.7

■ COMO FUE EL INICIO?

Voluntario: 96.32%

Coerción: 2.47

Violencia: 1.21

■ CANTIDAD DE PAREJAS SEXUALES: mediana 2 Rango (1 a +de 10)

■ SITUACIÓN DE EMBARAZO:

Al momento de la encuesta 20% de las encuestadas se hallaba embarazada.

Del total de las encuestadas: 47% tenían antecedente de embarazo pasado o actual.

■ EDAD AL PRIMER EMBARAZO: 16.7 años DS 1.57

RESULTADOS

■ SE CUIDARON EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL:

68%

■ QUÉ TIPO DE MÉTODO UTILIZARON:

Preservativo: 84.4%

Preservativo más pastillas: 7.8%

Pastillas 2%

Coito interrupto 4.2%

Ritmo: 0.4%

■ 32% no se cuidaron

■ RAZONES DE NO CUIDADO:

Relación inesperada: 36.1%

Falta de información: 20%

Él no quiso: 13.3%

No embaraza la primera vez: 9.4%

Quería embarazo: 3.7%

No contesta: 7.8%

RESULTADOS

■ OTRAS PRÁCTICAS SEXUALES:

Practican sexo oral: 490 (37%)

Causas: Por placer: (81%)

Como anticonceptivo (1.4%)

Ambos 15.2%

Porque te obligan: 2.4%

NO Se cuidan durante el sexo oral: 77 (84%)

Practican sexo anal: 243 (18.2%)

Causas: Por placer (65.2%)

Como anticonceptivo: (4.1%)

Ambos: (18.4%)

Porque te obligan: (12.3%)

NO se cuidan durante el sexo anal: 67.4%

RESULTADOS

■ EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL, SE CUIDARON?

De las que no estaban embarazadas,
37% no se cuidaron.

■ LA RAZÓN DEL NO CUIDADO FUE:

Sexo inesperado: 12%

Quería embarazo: 12% y por no querer ella 5%

No sabe/no contesta: 17%

RESULTADOS

■ CONOCIMIENTO DE ITS:

Sí: 93%, fundamentalmente HIV y sífilis.

■ PREOCUPACIÓN POR EL CONTAGIO:

65% sí

75% asumen que se pueden contagiar sin tener relaciones sexuales.

■ TOMA ALGÚN RECAUDO PARA NO CONTAGIARSE:

23% con sólo tener pareja estable.

27.3 % no toma ningún recaudo

RESULTADOS

■ VIOLENCIA EMOCIONAL:

37% de las encuestadas asume haber padecido algún tipo de violencia emocional. No contesta 2%

Cuando se realiza el sub-análisis por sector, el público tiene una prevalencia de 42%, mientras que a nivel de obras sociales y privado la misma disminuye a 26%

La pareja es el autor de la violencia en 32% de los casos, cifra que se mantiene en los otros niveles de cobertura.

La etapa de la vida en que se produjo: adolescencia en más del 60 % de las encuestadas.

RESULTADOS

■ VIOLENCIA FÍSICA:

Reconocen violencia física en forma reiterada 23%

No contesta 3.38%

Nuevamente la pareja es la mayor frecuencia

■ HABER PRESENCIADO VIOLENCIA CONTRA OTRAS MUJERES DEL GRUPO FAMILIAR PRIMARIO:

40% respondieron que sí

■ REFERENCIA CONCRETA SOBRE HABER SIDO TOCADA EN FORMA INAPROPIADA:

Respondieron que sí: 19%

Antecedente de contacto sexual obligadamente: sí, 9%

RESULTADOS

■ CONSUMO DE SUSTANCIAS:

Tabaco: 53.7%

Alcohol: 67.1%

Marihuana:15%

Paco-cocaína:4.6%

RESULTADOS

■ RELACIÓN ENTRE ANTECEDENTE DE VIOLENCIA EMOCIONAL, FÍSICA Y/O TOTAL Y PRIMER EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA:

33% de las encuestadas que reconoció antecedente de algún tipo de violencia reiterada durante su vida tuvo su primer embarazo durante la adolescencia: dato que fue estadísticamente significativo. ($\chi^2: 25.85$ p .0000)

■ RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA FÍSICA DURANTE SU VIDA Y PRIMER EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA:

23 % de las adolescentes que refirieron este antecedente tuvieron su primer embarazo en la adolescencia, dato estadísticamente significativo, No contestan 3.38%

■ RELACIÓN ENTRE HABER PRESENCIADO VIOLENCIA CONTRA MUJERES DEL GRUPO FAMILIAR :

48% tuvieron su primer embarazo en la adolescencia, esto también es estadísticamente significativo.

CONCLUSIONES

- No ha variado la edad de la menarca, ni la edad de inicio de las relaciones sexuales, siendo las mismas iniciadas en forma voluntaria y vaginal en la mayoría de las encuestadas.
- Respecto de los embarazos, 8.43% reconocen haber pasado por una situación de aborto no espontáneo, y la edad al primer embarazo suele ser al año de iniciadas las relaciones sexuales.
- A pesar del paso del tiempo, las campañas de información y la educación recibida, sólo 68% se cuida en la primera relación, y en 36% de los casos de no cuidado, fue por sexo inesperado. Si bien es cierto que el uso del preservativo ha aumentado durante los últimos años, constituyéndose en el método más utilizado, el porcentaje de cuidado en la última relación sexual disminuye (63%) y las causas más argumentadas son 12% quería embarazo y 5% no se quería cuidar ella, y 17% no sabe por qué no se cuidó.
- Respecto del conocimiento de las ITS, 93% reconocen fundamentalmente al VIH y la sífilis, llama la atención que tanto las trichomonas (tal vez las más frecuentes y facilitadoras de otras ITS) y la clamydias, sean las menos conocidas.

CONCLUSIONES

La preocupación por el contagio estuvo presente en 65% de las encuestadas, cifra que coincide con las que se cuidaron, y 75% asumen que se pueden contagiar sin tener relaciones, pero en su mayor parte piensan en el contagio por contacto con productos derivados de la sangre pero no tienen en cuenta otras formas de contagio como el piercing y la transmisión vertical. El otro hecho a tener en cuenta es que 23% piensan que con sólo tener una pareja estable (recordemos que los adolescentes son monógamos seriadados), están protegidos del contagio y 27% no saben cómo protegerse.

En cuanto a la variable violencia investigada en esta encuesta, si bien reconocemos que es una variable difícil de averiguar, dado el ocultamiento por diferentes razones que hacen las mujeres de ello, reconocemos que existe un porcentaje de adolescentes (37% emocional) (27% para la física) que la registran durante su vida, y llamativamente este hecho se asocia al antecedente de primer embarazo durante la adolescencia. Es cierto que estos resultados provienen de una muestra pequeña y que el diseño no es óptimo desde el punto de vista metodológico para investigar esta asociación pero nos alerta sobre la necesidad de hacer investigaciones más extensas en este aspecto, dada la importancia que reviste el mismo.

Muchas gracias por su atención